




DIE REBE

SPROSSRANKEN
Zweige, Blätter, Ranken
Photosynthese, Bestand und Wachstum des Rebstocks

WEINLESE
100 % manuell, während 2 bis 3 Wochen

4 REGIONEN
Vallée de la Marne, Montagne de Reims, Côte des Blancs, Côte des Bar




WURZELSTOCK
Aufnahme Wasser und Mineralien
Verankerung des Rebstocks,
Quelle von Kraft und Lebensdauer

SORTEN
Vitis vinifera
Amerikanische Unterlage

7 ZUGELASSENE REBSORTEN
Chardonnay, Pinot blanc, Petit Meslier,
Arbane, Pinot gris,
Pinot noir und **Meunier**

PINOT NOIR



MONTAGNE DE REIMS
CÔTE DES BAR

Austrieb*: 2.	Reifung*: 1.
Fünfeckiges Blatt, Stielbucht V-förmig	


CHARDONNAY



CÔTE DES BLANCS • CÔTE DE SÉZANNE
COTEAUX VITRYATS • MONTGUEUX

Austrieb*: 1.	Reifung*: 3.
Vollständiges Blatt, U-förmige Stielbucht	

MEUNIER



VALLÉE DE LA MARNE

Austrieb*: 3.	Reifung*: 2.
Junge, flaumige Blätter	

* durchschnittliche Daten aus dem Gebiet der AOC Champagne

4 ZUGELASSENE SCHNITTSYSTEME

ZIEL: GLEICHGEWICHT ZWISCHEN KRAFT UND FRUCHTBARKEIT DES REBSTOCKS. SCHNITTDIPLOM ERFORDERLICH

CORDON DE ROYAT



Optimiertes Gleichgewicht
Blätter / Früchte

Verbreitet beim Pinot noir

CHABLIS



Gute Verteilung der
Vegetation

Besonders geeignet für
Chardonnay

GUYOT



Einfacher und rationeller
Schnitt

Für alle Rebsorten

VALLÉE DE LA MARNE



Begünstigt die
Fruchterzeugung

Nur für Meunier zulässig



ICH KENNE AUF DIESER WELT NICHTS ERNSTERES ALS DEN
WEINBAU.



VOLTAIRE

Weitere Informationen : champagne.education